

LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA

CJENOVNIK USLUGA LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA

VRSTA USLUGE		KM		NOVO - NOVO - NOVO	
ANTI TITIJELA & Scaron; TITNE ŽLIJEZDE		KM		ANTI TPO	40
ANTI TG	40				
OSNOVNI HEMATOLO& Scaron; KI NALAZI		KM		SE & Scaron; Sedimentacija	4
& Scaron; Kompletna krvna slika	5			DKS & Scaron; Diferencijalna krvna slika	5
		BIOHEMIJA	KM	& Scaron; UK & Scaron; & Scaron; eæer u krvi	4
				Urea	4
Kreatinin	4	Fe & Scaron; Željezo u serumu	5	Bilirubin	4
Trigliceridi	4	Holesterol	4	HDL	4
Globulini	4	Ukupni proteini	4	LDL	4
kiselina)	4			Albumini	4
		KOAGULOGRAM	KM	TIBC	4
D - Dimer	40	PT	6	Fibrinogen	6
INR	6	Vrijeme krvarenja	4	Vrijeme zgrušavanja	4
		ENZIMI	KM	AP (alkalna fosfataza)	4
ALT (transaminaza)	4	Amilaze (S) i (U)	4	LDH	4
HORMONI & Scaron; TITNE ŽLIJEZDE		KM		TSH	10
				T3	10
				T4	10
				FSH	15
				PROGESTERON	17
PROLAKTIN	17	ESTRADIOL	17	TESTOSTERON	17
HCG	50			LH	15
		ELEKTROLITI	KM	P (Fosfor)	4
				Ca (Kalcium)	5
Na	7				
K	7				
Cl	7				
Mg	4	Fe	5		
		REUMATSKI TESTOVI	KM	ASTO	5
		TUMOR MARKERI	KM	PSA (total, free, Ratio)	55
		Ca125	25	CEA	25
		Ca15-3	30	OSTALO	KM
				HbA1C & Scaron;	

Glikolizirani hemoglobin (procijena vrijednosti & Scaron; uka u zadnja tri mjeseca)					20
Urin	7	Urinokultura	20	Total IgE	30
Antibiogram	20	Bris nosa	20	Test na Helikobakteri pilori	15
krvarenje	20	Klirens kreatinina	10	Bris guše i ždrijela	20
NALAZA				Stolica na okultno	

Poštovani pacijenti! Kako bi Vaši laboratorijski rezultati bili pouzdani, neophodno je da se adekvatno pripremite i uputite u procedure prije samog davanja uzorka. OPŠTE UPUTE: Izbjegavati sve lijekove 48 sati prije uzimanja uzorka (osim onih koje je ljekar odredio kao obavezne), jaèu fizièku aktivnost i uzimanje alkohola. Prije vađenja uzorka krvi treba biti 10-12 sati natašte. Zadnji obrok smije biti lagana veèera (izbjegavati slatko i masno). Vodu je dozvoljeno piti. Ujutru na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati nista osim vode. POSEBNE UPUTE: Određivanje lipidnog statusa (48 sati prije uzimanja krvi izbjegavati premasne obroke) Željezo (48 sati ne piti sokove obogaæene vitaminima, šumeæe tablete, multivitaminske napitke). Okultno krvarenje u stolici (7 dana prije ne uzimati lijekove koje dovode do krvarenja u stolici, test se ne radi u toku menstruacije, proljeva, krvarenja iz hemoroida) Uzimanje jednokratnog urina (srednji mlaz prve jutarnje mokraæe) Kreatinin klirens-prikupljanje 24-satne mokraæe (prvi jutarnji uzorak mokraæe baciti, a svu ostalu mokraæu ukljuèujuæi i prvi jutarnji uzorak slijedeæeg dana skupljati u jednu posudu, tokom skupljanja mokraæu držati na hladnom mjestu, svu skupljenu kolièinu 24-satne mokraæe donijeti u laboratoriju). PRETRAGE KOJE TREBAJU BITI NATAŠTE: & Scaron;EÆER, HbA1C, HOLESTEROL, TRIGLICERIDI, HDL, LDL, ŽELJEZO, FIBRINOGEN, BILIRUBIN, AST, ALT, GGT, AP, LDH, CK.....) Minerali (Na, K, Cl, Mg, Ca, P) PRETRAGE KOJE NE TREBAJU BITI NATAŠTE: SE, KS, UREA, KREATININ, PV, APTT, INR, HORMONI & Scaron; TITNE ŽLIJEZDE, GINEKOLOŠ KI HORMONI, TUMOR MARKERI, HELICOBACTER PYLORI

UVIJEK SA VAMA

POLIKLINIKA & Scaron; S U N C E & Scaron; Zenica